

# Medikamentenliste + Dosierungen

## Feldhasen & Wildkaninchen

### **ANTIBIOSE:**

**Cotrim K Saft:** (VP) 0,1ml/100g Tier 2-3x tägl. mind. 5 Tage

**Cotrim E Saft** 0,05ml/100g Tier

Behandlung von bakteriellem Durchfall, Lungenentzündung, Harnwegsinfektionen, Ohrenentzündungen sowie des Mund- und Rachenraums (mögliche Wirksamkeit gegen Kokzidien) sehr gut verträglich

**Chloramphenicol N-Pulver:** (VP)

3x täglich mind. 5 Tage 3x täglich mind. 5 Tage 2,5mg/100g, Pulver muss mit einer Feinwaage abgemessen werden

**Antibiotika der 1. Wahl bei Nagetieren.**

Behandlung von bakteriellem Durchfall, bei Bissverletzungen, Lungenentzündung sowie bei Abszessen.

**Veraflox Suspension 25mg/ml:** (VP) 0,03ml / 100g 1x täglich über mindestens 5 Tage

Gute Wirksamkeit bei Abszessen, Katzenbissverletzungen

**Baytril 2,5%:** (VP) Injektionslösung s.c. 0,04/100g Flavour (für orale Gabe)

Breitband Antibiose Bei Jungtieren Knochen, Knorpel und Zahnschmelzschädigung möglich daher keine Langzeitbehandlung!

Zum Anfluten am besten 2x täglich danach je nach Zustand 1-2x täglich

Bei Abszessen, Katzenbissen, Lungenentzündungen und Blasenentzündungen

**Parofor:** (VP) 2g /1,4ml Flüssigkeit davon 0,2ml/100g Tier 2-4 Tage 2x täglich dann 8-10 Tage 1x täglich p.o. in

Ausnahmen bei großen Beständen in Volieren kann man 40g /1 Liter Wasser über das Trinkwasser geben. (Ersatzweise Humatin Kapseln, da aber andere Dosierung)

Mittel zur Behandlung von Kryptosporidien und E.coli Bakterien

### **SCHMERZMITTEL:**

**Metacam:** (VP) für Katzen 0,5mg/ml 1 Tropfen 1-2 x täglich

Schmerzmittel der 1. Wahl

Bei Bissverletzungen, Entzündungen, Schwellungen, Frakturen sowie Schmerzen im Allgemeinen.

**Novalgin Tropfen:** (VP) 1 Tropfen alle 4-6 Std.

starke Schmerzen, Krämpfe, Bauchschmerzen, Fieber Gabe muss alle 4-6 Std. erfolgen.

**Traumeel:** (AP) 2-4x tägl. 0,1-0,2ml Wunden können damit auch abschließend gespült werden

zur unterstützenden Behandlung bei Trauma, Kopfschiefhaltung Entzündungen, Schwellungen, Schock, Schmerzen im Allgemeinen.

**Alvegesic:** (VP) (0,2mg/kg) 10mg/ml 1:10 verdünnt davon max. 0,05ml/100g alle 4 Std.

bei starken Schmerzen. Kann auch ergänzend bei Inhalationsnarkose gegeben werden.

**Gabapentin Liquid 50mg/ml:** (VP) 0,02ml/100g orale Gabe max. alle 8 Std.

bei starken Schmerzen, Krämpfen, Epilepsie, Nervenschmerzen

## **SCHWINDEL / ÜBELKEIT:**

**MCP Saft:** (VP) 0,05-0,1ml /100g bis zu 3x täglich

+ **Emeprid Saft:** (VP) 1-2 Tropfen / 100g oral eingeben bis zu 3x tägl.

bei Übelkeit / Erbrechen

**Cerenia:** (VP) 0,01ml /100g s.c.

wird subkutan gespritzt. Gute Wirksamkeit bei Schwindel / Übelkeit Appetit anregend

**Vertigoheel:** (AP) 1 Tropfen oral 2x tägl.

Gegen Schwindel vor allem bei SHT-Trauma

## **PARASITENMITTEL:**

**Vecoxan:** (VP) 0,04-0,05 ml/100g 2x im Abstand von 2-3 Tagen evtl. wdh. nach 1 Woche

bei Leberkokzidiose 1x tägl. über 12-14 Tage

jedes Eichhörnchen wird bei Befall oder vor der Unterbringung in eine Auswilderungsvoliere gegen Kokzidien behandelt.

(Stresssituationen = Vermehrung von Kokzidien)

**Baycox:** (VP) 5% 0,02ml/100g 1x tägl. 3-5 Tage ggf. Wdh.

Gegen Kokzidiosen. **Achtung Baycox 2,5% darf ausschließlich über das Trinkwasser verabreicht** werden!

Niemals unverdünnt oral eingeben da es ätzend wirkt!!!! Baycox 5% ist eine orale Suspension.

Allerdings ist das Vecoxan bei Kokzidiose zu bevorzugen.

**Kokzidiol SD:** (VP) Berechnung nach Trinkmenge! 5-7 Tage ggf. Wdh.

Gegen Kokzidiosen sowie bei Infektionen des Magen-Darm Traktes besonders bei Coli-Infektionen und Salmonellosen. Verabreichung über das Trinkwasser. Zur Behandlung bei größeren und mehreren Tieren in Volieren. (Kann Leber und Nierenschädigungen hervorrufen!)

**Panacur 2,5% oder 10%:** (VP)

2,5% 0,1ml /100g 10% 0,02ml /100g 3-5 Tage ggf. Wdh.

Behandlung bei Giardien und bei Wurmbefall. Dosierung bei den verschiedenen Stärken beachten.

**Capstar Tablette 11,4mg:** (AP) orale Eingabe in Wasser aufgelöst 0,1mg /100g

Schnelle Wirkung bei Madenbefall (wo sie nicht abgesammelt werden können und wenn sie bereits im Tier sind)

**Petvital Verminex von Canina:** (F)

Verklebt Flöhe laut Hersteller gegen Lästlinge aller Art.

Frei von toxischen Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen bedenklichen Stoffen.

Bei erwachsenen Eichhörnchen max. 10 Tropfen beginnend im Nacken an der Wirbelsäule verteilt aufzutropfen.

Ebenfalls 1 Tropfen in den Innenschenkeln und Innenarmen.

**Exner Petguard:** (F)

Wirkung gegen Pilze, Flöhe, Haarlinge, Läuse, Milben sowie Zecken.

Hierbei handelt es sich um ein absolut ungefährliches Mittel das vorsichtig auf das Tier aufgesprüht wird. Bei Parasiten kommt es nach kurzer Zeit zu Verklebung des Bewegungsapparates sowie der Verstopfung der Atemwege.

Bei Pilz wird das Wachstum gehemmt.

Weitere Infos auch im Gutachten: [www.exner-petguard.de](http://www.exner-petguard.de)

**Oregano Öl:** (F) muss in Wasser gelöst werden (siehe Hersteller Angaben)

Gute Wirkung gegen Kokzidien, Würmer keine Resistenzbildung kann ggf. über das Trinkwasser verabreicht werden

## **WUNDVERSORGUNG:**

### **Medihoney: (AP) nach Bedarf auftragen**

Antibakterieller medizinischer Honig. Ideal für Abszesswunden sowie Bissverletzungen.

### **Leukase N Kegel: (VP) je nach Größe der Wunde ½ – 1 Tablette**

Nach Abszess Behandlungen oder auch bei Katzenbissverletzungen.

### **Tyrosur Gel und Puder: (AP) nach Bedarf auftragen**

Infektiöse Wunden auch Katzenbiss zusätzlich zur Antibiose lokal auftragen.  
(bei stark nässenden Wunden hat sich der Puder bewährt)

### **Manukalind: (F) nach Bedarf auftragen**

Auf schlecht heilende Wunden auftragen.

### **Rebohexanid Wundgel: (AP) nach Bedarf auftragen**

Zum Reinigen sowie feucht halten von Wunden hilft auch bei MRE/MRSA Keimen.

### **Adrenalin: (VP) einige Tropfen (getränkter Tupfer / Wattestäbchen) mit Druck auf die Wunde**

Stark blutende Wunden

### **Dermamycin Salbe: (VP) nach Bedarf auftragen**

bei bakterieller Dermatitis, nässenden, juckenden Hautstellen

## **KORTISON:**

### **Voren Depot: (VP) 0,05ml /100g wdh. ggf. nach 3-4 Tagen**

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Schock, Krämpfe

### **Prednisolon 1%: (VP) 0,01ml/100g**

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Schock, Krämpfe (kann auch oral verabreicht werden)

### **Dexamethason: (VP) 0,01-0,02ml /100g**

Bei Schockzuständen, Krämpfe (kann auch oral verabreicht werden)

## **ATEMWEGE:**

### **Bisolvon Pulver: (AP) 0,05ml/100g alle 8-12 Std. orale Eingabe**

Schleimlöser bei Erkältungen.

### **Bricanyl: (VP) 0,02ml/kg → 1:10 verdünnen davon 0,02ml/100g**

### **Inhalation: Kochsalzlösung (ggf. 1 Tropfen Dexamethason) + 0,5ml ACC Injekt + 0,25ml Pulmicort**

Die Mengenangaben beziehen sich auf eine Inhalationskammer eines Kaltverneblers. In Pulmicort ist schon Kortison enthalten, daher nicht zusätzlich Dexamethason. Und Pulmicort in der schwächeren Konzentration von 0,5mg/2ml (es gibt auch 1mg/2ml)

## **OHRENENTZÜNDUNG:**

Antibiose z.B. Cotrim K und zusätzlich:

**Ohrentropfen - Mischung: 4 Teile NaCl 2 Teile Baytril 2,5% und 2 Teile Hexadreson nach Bedarf**

## **AUGEN:**

### **Bepanthen Augensalbe, Corneregel, VITA POS: (AP) nach Bedarf mindestens 2x täglich anwenden**

Zur Pflege und Befeuchtung von gereizten Augen, zur Regeneration von Bindehaut- und Hornhautverletzungen, als Ergänzung bei einer medikamentösen Behandlung

### **Euphrasia Augentropfen: (AP) nach Bedarf 1 Tropfen ins Auge (mind. 5x tägl.)**

zur Pflege bei gereizten Augen, als Ergänzung bei einer medikamentösen Behandlung

### **Floxal: (VP) nach Bedarf mind. 4x tägl. auftragen**

antibiotische Augentropfen oder Salbe bei eitrigen Augenentzündungen sowie bei Fremdkörpern im Auge

### **Cortisonhaltige Augensalben: (VP) nach Bedarf auftragen**

Vorsicht bei Hornhautverletzung nicht anwenden

## **VERDAUUNG:**

### **Bene Bac oder auch ProPre-Bac (verbesserte Rezeptur) Bac: (F)**

zu jeder Fütterung ½ -1 Erbsengröße

Bei Problemen im Darm.

Bei Umstellung von Muttermilch auf Katzenmilch.

### **Stullmisan: (F) ca. 1 Msp. zu jeder Fütterung**

Mittel zur Linderung bzw. stoppen von Durchfällen.

### **Sab Tropfen oder Dimeticon (speziell für Tiere): (F)**

nach Bedarf ggf. zu jeder Fütterung 1-3 Tropfen

Bei Blähungen sowie Durchfällen.

### **Lacteol Pluver: (AP) je nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen**

Bei Durchfallerkrankungen. Gute Darmbakterien.

### **Perenterol: (AP) je nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen**

Bei Durchfallerkrankungen. Gute Darmbakterien.

### **Infecto Diarrstop LGG Banane: (AP) je nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen**

Bei Durchfallerkrankungen. Gute Darmbakterien.

### **Dystan: (F) ca. 1 Msp. zu jeder Fütterung**

Mittel zur Linderung bzw. stoppen von Durchfällen.

### **Diarsanyl: (F) 3x tägl. ca. ½ Erbsengröße in Wasser auflösen**

Bei starken Durchfällen es kleidet den Darm aus.

### **Nux Vomica D12: (A) 3 Globuli auf 1ml 0,1ml 2-3xtäglich**

### **Mucosa Comp.: (AP) Ampullen 0,1-0,2ml 3x täglich**

Unterstützt und hilft bei der Regeneration der Schleimhäute (auch Darmschleimhaut)

### **Aciprim: (AP)**

Darmbakterien in Akutfällen 1 Msp. 1x täglich

### **BIO-Lapis for Rabbits: (F)**

1 Beutel in Wasser auflösen und nach Bedarf über den Tag verteilt verabreichen im Kühlschrank für max. 24 Std. haltbar

### **Spascupreel: (AP)**

Hilft bei Magen-Darm Krämpfen 2 Tropfen/100g Tier alle 4-6 Std.

## **BLASE:**

**SUC:** Solidago, Ubichinon, Coenzyme (am besten Ampullen mischen) *nach Bedarf 3x täglich 0,1ml aus der Mischung*

**Hilft gut bei Harngrieß dazu Antibiose (Cotrim)**

Es kann sein, dass der Urin vom Tierarzt mit einer ganz dünnen Nadel abgezogen werden muss.

## **NAHRUNGSERGÄNZUNG / ELEKTROLYTE:**

**Vitamin B Komplex:** (VP) 0,05-0,1ml / 100g *subkutan*

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Krämpfe, appetitanregend sowie als Zusatz bei Infusionen. Vorsicht bei Hasen und Kaninchen nur bei Bedarf

**Oralpädon Apfel-Banane:** (AP) *nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen*

Elektrolyte bei Durchfallerkrankungen.

**Sterofundin BG-5:** (VP) 5ml/100g *in 24 Std. nach Bedarf 2-3x täglich*

Elektrolyte mit Glucose als Infusion sowie zur oralen Gabe

**Ringerlösung:** (A) 5ml/100g *in 24 Std. nach Bedarf 2-3x täglich*

Elektrolyte zur Infusion sowie zur oralen Gabe

**Aktivtropfen von Herbavital:** (F) *1-2 Tropfen oral*

bei Tieren mit Kreislaufproblemen. Auch als 1. Maßnahme 1-2 Tropfen auf die Mundschleimhaut

## **IMMUNSYSTEM:**

**Zylexis:** (VP) *1 Ampulle subkutan ggf. auf 2 Tage aufteilen*

zur Stärkung des Immunsystems.

Bei Abszessen, Erkältungen, bakteriellen sowie Virusinfektionen

**Bioserin:** (F) 0,1-0,2ml /100g *Tier 2-3x tägl.*

zur Stärkung des Immunsystems

**Engystol:** (AP) *1-2x tägl. 0,1-0,2ml p.o.*

zur Stärkung des Immunsystems vor allem bei Atemwegsproblemen.

**Albrecht Immun:** (AP) *3-4x tägl. 0,1-0,2ml p.o.*

Molke aus Kolostrum. Enthält einen hohen Anteil an natürlichen Immunglobulinen.

Sehr gut bei Immungeschwächten oder sehr kleinen Babys. Auch bei Tieren mit starkem Durchfall.

**Propolis Tropfen:** (F)

zur Stärkung des Immunsystems kann in einen extra Schälchen mit Wasser älteren Tieren angeboten werden.

**Bergophor Globulac L:** (F) kann je nach Bedarf mit in die Aufzuchtmilch eingerührt werden oder auch pur in Wasser gelöst meist 3 Teile Wasser : 1 Teil Pulver

**Manuka Honig:** (F)

zur Stärkung des Immunsystems nach Bedarf in warmem Wasser auflösen

## **SCHOCK:**

lebensbedrohlicher Zustand

Aktivtropfen 1-3, Rescue Tropfen o. Bachblüten SOS ohne Alkohol 1-3, Aconitum C1000 oder C200 Globuli in 0,2ml Wasser auflösen davon 1-2 Tropfen,  
Infusionen, Wärme, Ruhe, abdunkeln

## **SEDATION / NARKOSE:**

**Diazepam Tropfen:** (VP) *für halbwüchsige Tiere 1 Tropfen für erwachsene Tiere 2 Tropfen*

orale Eingabe für einen stressfreien Tierarztbesuch. Sollte nur bei erwachsenen oder sehr scheuen halbwüchsigen Tieren verwendet werden.

**Isofluran:** (VP) *nach Bedarf*

für die Inhalationsnarkose, eine schonende Methode mit super Verträglichkeit für das Tier ist.  
Ggf. dazu ein Schmerzmittel verabreichen.

**Tripel-Narkose:** (VP) *gut verträglich und vollständig antagonisierbar*

AP = apothekenpflichtig (frei erhältlich in jeder Apotheke)

VP = verschreibungspflichtig

F = frei erhältlich

**Diese Liste basiert auf meist jahrelanger Erfahrung von Tierärzten in der Behandlung von Eichhörnchen.**

Alle Angaben bezüglich Dosierung und Anwendung beruhen auf unseren persönlichen, meist jahrelangen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Tierärzten.

Daher wird in keinem Fall eine Haftung übernommen.

Eine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben kann nicht gegeben werden.

Im Zweifelsfall sollte bezüglich der Wirksamkeit, Dosierungsempfehlung, Kontraindikationen sowie Nebenwirkungen eine eigene Prüfung erfolgen.

Es ist möglich, dass es gleichwertige Präparate von anderen Herstellern gibt.